

## Images Description and Claims (137 Kb)

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(11) WO 02/089757

(13) A2

- (21) PCT/EP02/04624
- (22) 26 April 2002 (26.04.2002)
- (25) German

(26) German

(30) 101 22 342.0

09 May 2001

DE

(09.05.2001)

- (43) 14 November 2002 (14.11.2002)
- **(51)**<sup>7</sup> **A61K 7/40**, 7/48, 31/35
- (54) USE OF *ISOFLAVONES* IN COSMETIC OR *DERMATOLOGICAL PREPARATIONS*
- (71) BEIERSDORF AG [DE/DE]; Unnastr. 48, 20245 Hamburg (DE).
- (72) BIERGIESSER, Helga [DE/DE]; Sandweg 16, 21465 Reinbek
- (75) (DE). GALLINAT, Stefan [DE/DE]; Martin-Niemöller-Str. 13, 22880 Wedel (DE). HERPENS, Andreas [DE/DE]; Steinburger Str. 5B, 21465 Reinbek (DE). VENZKE, Kirsten [DE/DE]; Novalisweg 27, 22303 Reinbek (DE). SCHÖNROCK, Uwe [DE/DE]; Lerchenweg 33, 23866 Nahe (DE). STÄB, Franz [DE/DE]; Bäckerstra. 3, 21279 Echem (DE).
- (74) BEIERSDORF AG; Unnastr. 48, 20245 Hamburg (DE).
- (81) JP, US
- (84) European patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)

For information on time limits for entry into the national phase please click here

## **Declarations under Rule 4.17**

- -- as to applicant's entitlement to apply for and be granted a patent (Rule 4.17(ii)) for the following designations JP, European patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)
- -- of inventorship (Rule 4.17(iv)) for the following designation US

- -- of inventorship (Rule 4.17(iv)) for the following designation US
- -- of inventorship (Rule 4.17(iv)) for the following designation US
- -- of inventorship (Rule 4.17(iv)) for the following designation US
- -- of inventorship (Rule 4.17(iv)) for the following designation US
- -- of inventorship (Rule 4.17(iv)) for the following designation US

## **Published**

- -- without international search report and to be republished upon receipt of that report
- (57) The use of substances selected from the following group: ipriflavone (7-isopropoxy-isoflavone), formononetin (7-hydroxy-4'-hethoxyisoflavonr) ononin (formononetin-7-O-β-D-glucopyranoside) 4'-isopropyl-isoflavone, mono-hydroxy-isoflavone, mono-hydroxy-dihydro-isoflavone, mono-hydroxy-tetrahydro-isoflavone, O-desmethylangolensin, dihydro-daidzein (dihydro-7,4'-dihydroxy-isoflavone), tetrahy dro-daidzein (tetrahydro-7,4'-dihydroxy-isoflavone), dihydro-genistein (dihydro-5,7,4'-trihydroxy-isoflavone), 2-dehydro-O-desmethyl-angolensin, dehydroequol, 4-hydroxy-7-glucose-isoflavone and 5-hydroy-7,4'-dimethoxy-isoflavone, in cosmetic or *dermatological preparations* in the treatment and prophylaxis of symptoms of inflammatory or itchy skin conditions in sensible skin and in modificiations of DNS synthesis and/or DNS repair in skin.







Français 5 of 6

WO 02/089757 PCT/EP02/04624

32

## Patentansprüche:

ď

15

- 1. Verwendung von Substanzen gewählt aus der Gruppe:
- Ipriflavon (7-Isopropoxy-Isoflavon), Formononetin (7-Hydroxy-4'-Methoxyisoflavon), Ononin (Formononetin-7-O-β-D-Glucopyranosid), 4'-Isopropyl-5 Mono-hydroxy-Isoflavone, Mono-hydroxy-Dihydro-Isoflavone, Isoflavon. Mono-hydroxy-Tetrahydro-Isoflavone, O-Desmethylangolensin, Dihydro-Daidzein (Dihydro-7,4'-Dihydroxy-Isoflavon), Tetrahydro-Daidzein (Tetra-Dihydro-Genistein (Dihydro-5,7,4'-Trihydro-7,4'-Dihydroxy-Isoflavon), hydroxy-Isoflavon), 2-Dehydro-O-Desmethyl-Angolensin, Dehydroequol, 4-10 Hydroxy-7-Glucose-Isoflavon und 5-Hydroy-7,4'-Dimethoxy-Isoflavon

in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen zur Behandlung, Pflege und Prophylaxe von sensibler Haut und/oder zur Behandlung und Prophylaxe der Symptome einer negativen Veränderung der physiologischen Homeostase der gesunden Haut.

- 2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei die Hautschäden und/oder negativen Hautzustände ein oder mehrere Erscheinungsbilder aus der folgenden Gruppe darstellen:
  - Veränderungen der normalen Lipidperoxidation,
- defizitäre, sensitive oder hypoaktive Hautzustände oder defizitäre, sensitive 20 oder hypoaktive Zustände von Hautanhangsgebilden,
  - entzündliche Hautzuständen,
  - atopisches Ekzem, polymorphe Lichtdermatose, Psoriasis, Vitiligo,
  - empfindliche, juckende oder gereizte Haut,
- Veränderung des Ceramid-, Lipid- und Energiestoffwechsels der gesunden 25 Haut.
  - Veränderung des physiologischen transepidermalen Wasserverlustes,
  - Verminderung der Hauthydratation und Abnahme des Feuchtigkeitsgehaltes der Haut,
- Veränderung des Natural Moisturizing Factor Gehaltes, 30
  - Verminderung der Zell-Zell-Kommunikation,
  - Mangelerscheinungen der intrazellulären DNS-Synthese.
  - DNS-Schädigungen und Verminderung von endogenen DNS-Reparaturmecha-

nismen,

- Aktivierung von Metalloproteinasen und/oder anderer Proteasen bzw. Inhibierung der entsprechenden endogenen Inhibitoren dieser Enzyme,
- Abweichungen von den normalen post-translationalen Modifikationen von Bindegewebsbestandteilen,
- Veränderungen des normalen Hyaluronsäure- und Glycosaminoglycangehaltes der gesunden Haut,
- Schuppenbildung der Haare,
- Hautbrüchigkeit und Hautemüdung,
- 10 Erhöhung der normalen Keratinozytenproliferation,
  - · Verminderung der natürlichen Regeneration der Haare,
  - umweltbedingte (durch Rauchen, Smog, reaktive Sauerstoffspezies, freie Radikale oder dergleichen verursachte) negative Veränderungen der Haut und der Hautanhangsgebilde.

15

20

25

30

5

- 3. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Gehalt an Isoflavonen (eine oder mehrere Verbindungen) in den kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen aus dem Bereich von 0,0005 bis 50,0 Gew.-%, insbesondere von 0,01 bis 20,0 Gew.-%, gewählt wird, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung.
- 4. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Gehalt an Isoflavonen (eine oder mehrere Verbindungen) in den kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen aus dem Bereich von 0,02 bis 10,0 Gew.-%, bevorzugt von 0,02 bis 5,0 Gew.-%, besonders vorteilhaft von 0,5 bis 3,0 Gew.-%, gewählt wird, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung.
- 5. Verwendung nach Anspruch 1, wobei die kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen sich durch einen zusätzlichen Gehalt an einem oder mehreren der folgenden natürlichen Wirkstoffe und/oder deren Derivaten auszeichnen: alpha-Liponsäure, Phytoen, D-Biotin, Coenzym Q10, alpha Glucosylrutin, Carnitin, Carnosin, Osmolyte, Klee-Extrakt, Hopfen- bzw. Hopfen-Malz-Extrakt.